

Aus der Hygienischen Abteilung des Sanitätsamtes der Marine-
Station der Ostsee, Kiel

(Leiter: Marineoberstabsarzt Priv.-Doz. Dr. R u g e)

Beitrag zur Serodiagnose der Gonorrhoe mittels Compligon

INAUGURAL-DISSERTATION

zur Erlangung der Doktorwürde

der Hohen Medizinischen Fakultät der

Christian - Albrechts - Universität

zu Kiel

Vorgelegt von

Marineoberassistentarzt Alfred Ruempler

aus Köln

K I E L

Druck von Carl Halbe

1934

Nr. 29

Rektoratsjahr 1933/34

Referent:

Privat-Dozent DR. RUGE


Korreferent:

PROF. DR. WEIGMANN

Zum Druck genehmigt:

PROF. DR. ROBERT SCHRÖDER
Dekan

Dem Geiste meiner Mutter
und meinem Kameraden
gewidmet!



Digitized by the Internet Archive
in 2026

Bald nachdem Waffermann und Bruck im Anschluß an die Versuche von Bordet und Gengou die Technik zur Anstellung von Komplementbindungsreaktionen bei Lues angaben, setzten Versuche ein, diese Reaktionen auch auf andere Infektionskrankheiten auszudehnen. Müller und Oppenheim gelang es zum ersten Mal im Jahre 1906, komplementbindende Antikörper im Serum eines an gonorrhöischer Arthritis Erkrankten festzustellen. Unabhängig von ihnen erschien kurz danach im gleichen Jahre eine Mitteilung von Bruck über einen positiven Ausfall der Komplementbindungsreaktion (K.B.R.) bei Gonorrhoe. Die darauf folgenden Veröffentlichungen über eine Nachprüfung des Verfahrens zeitigten einander stark widersprechende Angaben über die Brauchbarkeit und den Ausfall der Reaktion. So blieb die K.B.R. fast zwei Jahrzehnte lang unbeachtet, zumindest deutscherseits, während sie im Gegensatz dazu von englischen und amerikanischen Autoren weiter ausprobiert und günstig bewertet wurde. Die Verschiedenheit in den Ergebnissen ist wohl zurückzuführen auf die Verschiedenheit und den unterschiedlichen Wert der Antigene und die Gegensätze in der verwandten Technik. Als Antigen wurden anfangs meist Aufschwemmungen von Gonokokkenkulturen verwandt, in denen die Bakterien durch milde Anwendung von Hitze abgetötet wurden und deren Konzentration man durch die Anzahl der im Kubikzentimeter Flüssigkeit vorhandenen Erreger berechnete. Die Versuche hierzu hatten zur Einführung der käuflich hergestellten Vakzinen, zuerst des Arthigons geführt. Entsprechend den großen Gegensätzen in den Berichten über die Erfolge bei Anwendung der käuflichen Vakzinen waren auch die Ansichten über die Spezifität der K.B.R. sehr geteilt. Die Schwierigkeit wurde verstärkt durch die Unmöglichkeit, die Gonorrhoe einwandfrei auf Tiere zu übertragen. Die von russischer Seite stammenden Berichte über geglückte Uebertragung der Infektion nach vorheriger Reizung der tierischen Schleimhaut mit Rindergalle konnten in Kontrollversuchen von Retzlaff

nicht befestigt werden. Damit fiel das Tierexperiment für therapeutische Versuche und zum Studium von immunisatorischen Vorgängen bei der Gonorrhoe fort, und man blieb auf die klinische Beobachtung angewiesen. Buschke und Langer brachten Erklärungen über die unterschiedlichen therapeutischen und serologischen Erfolge bei der Verwendung der handelsüblichen Vakzinen, indem es ihnen an Reihenuntersuchungen nachzuweisen gelang, daß die Vakzinen durch Autolyse der in ihnen enthaltenen Bakterienkörper allmählich ihre Wirksamkeit verlieren. Durch die Mißerfolge mit den käuflichen Vakzinen veranlaßt, ging man daran, andere Verfahren zur Herstellung von Vakzinen auszuarbeiten. Durch Wolff und Sachs wurde die Frischvakzine eingeführt, während andere Autoren (Hecht, Zotter, Bucura) eine Steigerung der Wirkung durch Autovakzine erhofften, schließlich wurde Lebendvakzine in Anwendung genommen (Loefer, Friebös, Wolff). Mit diesen Versuchen setzte eine lebhafte Tätigkeit ein, die serologische und therapeutische Wirksamkeit der Vakzinen zu verbessern. So berichtete Kloeppe1 1924 aus der Tübinger Klinik, an der wie in anderen Instituten mit selbst hergestellten Vakzinen gearbeitet wurde, über gute Ergebnisse bei der Prüfung auf die Spezifität der K.B.R. Die unterschiedliche Beurteilung in der Spezifität führte er darauf zurück, daß die Wirkung des Antigens bei der Reaktion abhängig ist von dem bei der Infektion vorwiegenden Gonokokkenstamm. Er empfahl also die Herstellung von Mischvakzinen, in denen möglichst viele Gonokokkenstämme vereinigt seien, denn je polyvalenter das verwandte Antigen sei, umso größer werde die Sicherheit, daß der jeweilige homologe Stamm mit darunter sei und umso häufiger würden dementsprechend die positiven Resultate. Auch untersuchte er die gonorrhoe positiven Sera auf ihre Komplementbindungsfähigkeit mit anderen Bakterien und fand dabei ein völlig negatives Ergebnis. Während diese und ähnliche Versuche nach der Originalmethode von Waffermann vorgenommen wurden und sich nur unterschieden in der Art und Herstellung des Antigens, wandelten Bruck mit seinen Mitarbeitern, Rubinstein und französische Autoren das angewandte Verfahren ab und benutzten zu ihren Untersuchungen das nicht veränderte aktive Serum der Patienten. Die theoretische Annahme, daß bei den von ihnen verwandten großen Serummengen durch Ueberschuß an Komplement oder haemolytischem Amboceptor oder beiden die Intensität der Komplementbindungen des Antikörper-Antigen-

komplexes gestört oder verringert würde, wurde dabei nicht be-
stätigt. Baldige Verarbeitung der Seren, spätestens 24—36 Stun-
den nach der Entnahme war allerdings erforderlich.

Von ganz neuen Gesichtspunkten in der Herstellung des An-
tigens gingen Pieper und Wolffenstein aus, die über die
Ergebnisse ihrer Versuche zum ersten Mal in einem Vortrag auf
dem 8. internationalen Kongreß für Dermatologie und Syphilis in
Kopenhagen 1930 berichteten. (Klin. Wschr. 1931, S. 354). Sie
gingen aus von Untersuchungen von Neufeld, Killian und
Tsunekawa, die festgestellt hatten, daß Pneumo- und Strepto-
kokken ihre immunisierende Kraft nicht verloren, wenn sie auch
längere Zeit gekocht wurden, während sie durch schonende Abtö-
tung erheblich an dieser Kraft einbüßten. Bei Anwendung dieser
Versuche auf Gonokokken fanden sie keine Reaktionsverminde-
rung gegenüber den durch schonende Abtötung der Bakterien
hergestellten Vakzinen. Bei mikroskopischer Untersuchung fanden
sie nur noch bröckelhafte Reste der Bakterienleiber. Sie folgerten
daraus, daß die Wirkung der so hergestellten Vakzine nicht durch
die Bakteriensubstanzen, sondern durch die von den Bakterien
ausgeschiedenen Toxine bedingt sei. Sie konzentrierten also ihre
Versuche auf Isolierung der Bakterientoxine. Sie ließen Gono-
kokken in einer Nährbouillon wachsen und ließen die Kultur so
lange darin, als ein Weiterwachsen der Bakterien festzustellen
war. Hörte das Wachstum auf, so zentrifugierten sie die Flüssig-
keit ab, sodaß in dieser keine Bakterienleiber, sondern nur noch
die Stoffwechselprodukte der lebenden Bakterien und die beim
Absterben frei werdenden Toxine enthalten waren. Bei Anwen-
dung des so gewonnenen Filtrates zu Reaktionsversuchen am
Menschen zeigten sich schwere toxische Erscheinungen, die durch
Erhitzung des Filtrates während 20 Minuten im Wasserbade auf
100 Grad herabgemindert wurden. Die Verringerung der toxi-
schen Wirkung wurde durch Ausschaltung eines im unerhitzten
Zentrifugat vorhandenen Impedineffekts erklärt. Anfänglich wur-
den in dieser Art und Weise nur Autovakzinen verarbeitet, doch
gingen Pieper und Wolffenstein bald dazu über, Mischvak-
zinen von starker Polyvalenz herzustellen. Sie fanden durch län-
gere Untersuchungen, daß ein Zusatz von 0,5% Carbolsäure zur
Konfervierung keinen störenden Einfluß auf den Impfstoff ausübt.
Das ursprünglich als lösliches Gonotoxin bezeichnete Präparat
wird heute von der Schering-Kahlbaum A.-G. unter dem Namen

„Compligon“ hergestellt. Dieses Compligon stellt also im Gegensatz zu den bisher gebräuchlichen Gonokokkenvakzinen einen Impfstoff dar, dessen Wirksamkeit nicht auf der Anwesenheit von Gonokokken, sondern auf seinem Gehalt an deren Endo- und Ektotoxinen beruht. Die Spezifität des Compligons wurde durch seine Verwendungsmöglichkeit für die K.B.R. und die Müller-Ballungsreaktion nachgewiesen. Daß durch die therapeutische Verwendung des Compligon sich die Immunitätsverhältnisse im Organismus verändern, zeigten Pieper und Wolfenstein durch den Umschlag der K.B.R. bei Gefunden, den sie meist am 3. Tag nach der Compligongabe feststellten und der nicht eintrat bei Einverleibung von Toxinen anderer Bakterien. Nach 10 Tagen hatte, wie sie feststellten, die Wirkung des Compligon wieder nachgelassen und die K.B.R. zeigte wieder ein negatives Ergebnis. In einer Reihe von Vergleichsversuchen stellten sie ferner fest, daß Compligon auch nach 25 monatigem Lagern in seiner Wirkung als Antigen gegenüber frischem kaum merklich nachgelassen, also keinen Titerverlust erlitten hatte.

Das an der hiesigen Hygienischen Abteilung verarbeitete Material besteht aus den Seren, die von der Abteilung für Haut- und Geschlechtskrankheiten des Marine-Lazarets Kiel-Wik zur Untersuchung geschickt wurden, sowie aus Blutproben der übrigen Krankenabteilungen des Lazarets und schließlich aus Proben, die ambulant von den Landmarineteilen und Bordkommandos eingefandt wurden zur Kontrolle einer evtl. überstandenenluetischen Infektion oder auch zur Beurteilung der Heiratsfähigkeit eines Mannes. Von Mitte Februar 1933 ab wurden systematisch bei jeder eingefandten Blutprobe zugleich mit der Wassermann-Reaktion, der Meinicke-Klärungsreaktion und der Müller-Ballungsreaktion auch die Komplementbindungsreaktion für Gonorrhoe vorgenommen. In der Technik der K.B.R. für Gonorrhoe erfolgte strenge Anlehnung an die zum Wassermann bei Lues übliche Technik. Wie dort wurde das Hammelblutkörperchensediment in der Verdünnung von 1 : 20 benutzt. Der Kaninchen-Hammelblut-Amboceptor wurde in einem Vorversuch mit Meerschweinchen-Komplement in der Verdünnung von 1 : 10 ausstitriert und für den Hauptversuch diejenige Dosis benutzt, die nach 20 Minuten Aufenthalt im Brutschrank bei 37 Grad Lösung bewirkte. Die Dosis muß das Vierfache derjenigen betragen, die nach 1 Stunde löst. Im Hauptversuch wurde das inaktivierte Patientenserum

1 : 5 verdünnt verwandt, das Compligon in der Verdünnung 1:3, 1 : 4, 1 : 5. Es wurde jeweils nur ein Antigen verwendet.

Tabelle I: Ausführung der K.B.R.

	Serum- Kontrolle	Extr. I.	Extr. II.	Extr. III.
Röhrchen Nr.	1	2	3	4
inakt. Pat. serum 0,2 + phys. NaCl Lsg. 0,8	0,4	0,2	0,2	0,2
Antigen (Compligon)	—	0,2 (1:3)	0,2 (1:4)	0,2 (1:5)
Complement 1 : 10	0,2	0,2	0,2	0,2
1 Stunde Brutschrank				
Haemolyt. System	0,4	0,4	0,4	0,4
1 Stunde Brutschrank				

Sobald die Kontrollreaktionen gelöst waren, wurden die Ergebnisse abgelesen; die K.B.R. brauchte dazu die gleiche Zeit wie die Lues-Wassermann-Reaktion, also meist ca. 1 Stunde nach Zusatz des haemolytischen Systems. Für die Bezeichnung der Stärke des Ausfalls wurden bei jeder Antigenverdünnung die Werte +, ++, +++, +++++ angegeben. Bei der Auswertung der Ergebnisse wurden Werte von +++, +++, +++++ und mehr als stark positiv, Werte darunter als schwach positiv bezeichnet. Die Eigenart des bei der Marine zur Verfügung stehenden Materials bringt es mit sich, daß gegenüber der Gesamtzahl der Reaktionen Seren von Fällen weiblicher Gonorrhoe verschwindend gering sind, sodaß sie für diese Zusammenstellung außer Acht gelassen wurden. Da sämtliche eingefandten Seren, die von Gefunden und Kranken, mit den Luesreaktionen auch auf ihre K.B.R. untersucht wurden, stammt der weitaus größte Teil der Seren von Nichtgonorrhoeikern, sodaß daraus sehr wohl Schlüsse auf die Spezifität der K.B.R. gezogen werden können. Unter den 4012 Reaktionen des Jahres 1933 stammen 410 Seren von Gonorrhoe-kranken, davon entfallen 248 auf die einfache, unkomplizierte Schleimhautgonorrhoe (Go. anterior und Go. posterior), 145 Reaktionen stammen von komplizierten Fällen, 17 von Fällen, die seit mindestens 1 Jahr als klinisch geheilt aus der Behandlung

stellt ist, so werden häufig über den Ansteckungstag unrichtige, nicht zu kontrollierende Angaben gemacht, die die Ansteckung evtl. 3—4 Wochen zurück verlegen, da der Mann zu diesem Termin zuletzt die Pflichtschutzbehandlung in Anspruch genommen hatte. So kommen häufig Angaben über eine weit zurückliegende Ansteckung zu Tage, während das klinische Bild das eines ganz frischen, akuten Trippers ist.

Unter der Rubrik der einfachen Fälle ist der frühe, wenn auch schwache Umschlag der K.B.R. in den ersten Tagen auffällig. Die beiden stark reagierenden und die schwach reagierenden Serien bis auf das vom 6. Tage stammen allerdings von Leuten, die vor zwei und mehr Jahren schon mal eine gonorrhöische Infektion durchgemacht hatten. Daselbe gilt von 2 stark reagierenden Fällen des 10. und von 2 Fällen des 18. Krankheitstages. Daß der positive Auschlag schon vor der Neuinfektion bestand, ist durchaus möglich; es könnte aber auch eine Sensibilisierung vorgelegen haben, die bei der Neuerkrankung den Auschlag bewirkte. Sieht man von den genannten Fällen ab, so ergibt sich ein fast völliges Fehlen der positiven Auschläge in den ersten 14 Krankheitstagen. Im weiteren Krankheitsverlauf zeigt sich ein ziemlich gleichmäßiges Ansteigen der positiven Fälle. In der Gesamtzahl der bei komplikationslosen Fällen angestellten Reaktionen ergibt sich, die starken und schwachen Reaktionen zusammenge-rechnet, ein positiver Ausfall in 59,2 %. Gegenüber anderen Zusammenstellungen (Kri ft j a n s e n, Bud l o w s k i, S a g h e r) erscheint diese Prozentzahl etwas hoch, sie mag aber bedingt sein durch die verhältnismäßig geringe Zahl von Reaktionen und wäre vielleicht auch bei größerem Material niedriger geworden.

In der Aufstellung der komplizierten Fälle wird der frühe positive Auschlag in den ersten 10 Tagen deutlich. Auch im weiteren Verlauf der Erkrankung zeigt sich ein erheblich geringerer Prozentsatz von negativen Reaktionen gegenüber den einfachen Fällen. Unter den 145 angestellten Reaktionen sind 84,1 % positiv. Einen Anhalt für die Verteilung der positiven Reaktionen auf die bei den Erkrankten vorliegenden Komplikationen gibt Tabelle III.

Den höchsten Prozentsatz positiver Reaktionen zeigt hierbei die gonorrhöische Arthritis, von 9 Fällen waren 8 stark positiv. Die Nebenhoden-, Prostata- und Samenblasenentzündungen zeigen ungefähr gleichen Prozentsatz positiver Auschläge, davon in dreiviertel der Fälle stark.

Tabelle III. Verteilung der K.B.R. auf die Komplikationen.

Zahl d. Reakt.	Komplikation	Ausfall d. Reakt.		%
		Stark	Schwach	
13	Lymphangitis + Lymphadenitis	5	4	69,2
57	Epididymitis	34	14	84,2
66	Prostatitis + Sperma- tocystitis	45	12	86,3
9	Arthritis gon.	8	0	88,9

Unter den 17 Fällen alter, klinisch abgeheilter Gonorrhoe waren nach 1 Jahr unter 7 Reaktionen 4 schwach, 1 (alte Prostatitis) stark positiv; nach 2 Jahren 1 schwach; nach 3 Jahren 2 schwache; nach 4 Jahren 3 schwache, einer stark positiv (vor 4 und mehr Jahren 3 mal gonorrhöische Infektion); nach 5 Jahren 2 Fälle schwach positiv. Diese Fälle waren sämtlich klinisch-bakteriologisch ercheinungsfrei auch nach Provokationen und wurden zwecks Erteilung der Heiratserlaubnis nachuntersucht.

Bei feropositiven Luetikern, bei denen anamnestisch und klinisch kein Hinweis auf eine überstandene Gonorrhoe bestand, war die K.B.R. in 6 Fällen schwach positiv, in 8 Reaktionen fand sich ein starker Ausfall (diese 8 Reaktionen beziehen sich auf 2 Patienten, deren Serum jedesmal diesen Ausschlag zeigte). Bei feropositiven Luetikern fanden sich zweimal positive K.B.R., bei denen die überstandene Gonorrhoe zugegeben wurde. Unter den 74 unspezifischen Fällen, unter denen sich nur 6mal ein starker Ausschlag fand, waren 15 Fälle von feronegativer, alter Lues (also 15 + 14 feropos. Lues von 74 Fällen = 39,3% der unspez. pos. Ausfälle), 2 Fälle von überstandenen Ulcus molle, die übrigen von den verschiedensten unspezifischen Erkrankungen. Auf die Gesamtzahl der bei Nichtgonorrhöikern angestellten 3602 Reaktionen machen diese unspezifischen Fälle nur 2%. Da unter den 74 unspezifischen Fällen sich 14 befanden, bei denen aus technischen Gründen (Abgang von der Marine u. ä.) mit Sicherheit eine frühere gonorrhöische Infektion nicht ausgeschlossen werden konnte, wurden noch die Reaktionen der ersten Hälfte des Jahres 1934 auf ihre unspezifischen Ausfälle durchgesehen. Vom 1. Januar bis 15. Juni 1934 wurden 1678 Reaktionen angestellt. Von während

diefes Jahres an Gonorrhoe Erkrankten ftammten 116 Reaktionen. 12 Reaktionen ftammten von Leuten, die feit 1 Jahr aus der Behandlung entlaflen und klinifch erfcheinungsfrei waren. Von diefen 12 zeigten 5 einen ftarken, 5 einen fchwachen positiven Ausfall, 2 einen negativen Ausfall. Von den 5 ftark Reagierenden hatten 3 eine Epididymitis gehabt. 2 Jahre zurüch lag die Infektion in 7 Fällen, von denen 2 ftark, 3 fchwach positiv und 2 negativ reagierten. Die beiden ftark Reagierenden hatten jeder 3 Infektionen hinter fich. Vor 3 Jahren hatten die letzte Erkrankung durchgemacht 11 Fälle, unter denen 2 einen ftarken, 4 einen fchwachen positiven, 5 einen negativen Ausfchlag zeigten. Von den 2 ftark Reagierenden war einer gerade an einer frifchen Lues erkrankt. 4 Jahre lag die letzte Infektion zurüch in 9 Fällen, von denen 2 ftark, 5 fchwach positiv, 4 negativ waren. In 12 Fällen lag die letzte gonorrhöifche Erkrankung 5 Jahre zurüch, von denen 4 fchwach positiv, 8 negativ waren. In 11 Fällen, bei denen die Infektion 6 Jahre zurüch lag, war einer ftark, 3 fchwach positiv, 7 negativ. 7 Jahre lag die Infektion zurüch in 4 Fällen, von denen einer fchwach positiv, 3 negativ waren. Bei einem Patienten, bei dem 2 Reaktionen fchwach positiv ausfielen, lag die Infektion fogar 10 Jahre zurüch. Diefes Fall war befonders deshalb intereffant, weil bei einer 3. Serumeinfendung die Reaktion plözllich ftark ausfiel, was fich bei Nachfragen als durch eine Arthigonvakzination 2 Tage vor der Serumentnahme bedingt heraufstellte. Nach Ablauf von weiteren 3 Wochen zeigte die Reaktion dasfelbe Ergebnis wie vor der Arthigoneinfpritzung, ein Hinweis, daß die K.B.R. nach Vakzination ca. 3 Wochen lang nicht verwertbar ift.

Unter den reftlichen 1494 von Nichtgonorrhöikern ftammenden Reaktionen hatten 45 einen positiven Ausfchlag, darunter 14 ftark, 31 fchwach. Ingefamt beträgt der unfpezififche positive Ausfchlag 3%. Unter den 45 unfpezififchen Reaktionen hat die Lues mit 12 Fällen den größten Anteil (26,7%), 2mal Ulcus molle vor 4 Jahren, eine unfpezififche Nebenhodenentzündung durch Fall, die übrigen verfchiedene unfpezififche Erkrankungen.

Die fo feftgeftellte unfpezififche Reaktionsbreite von 2–3% liegt im Rahmen einer jeden biologifchen Reaktion. Die Aufftellung zeigt ferner, daß ein Mitreagieren der K.B.R. bei der Lues öfters vorkommt, und der Ausfall der K.B.R. bei Syphilis

vorsichtig zu bewerten ist. Sehr auffällig ist das lange und starke Nachreagieren der K.B.R. selbst Jahre nach der überstandenen Infektion. Da die Seren von früher Erkrankten nur in verhältnismäßig vereinzeltten Fällen aus irgendwelchen äußerlichen Anlässen eingefandt wurden, erscheinen die Zahlen hier hoch, während sie bei systematischer Nachkontrolle, die leider technisch kaum durchführbar ist, voraussichtlich ein weniger schweres Bild geben würden.

Aus der Zusammenstellung der an der hiesigen Hygienischen Abteilung vorgenommenen Komplementbindungsreaktionen wird Folgendes ersichtlich: Die K.B.R. mittels Compligon ist hinreichend spezifisch. Im Allgemeinen wird die Reaktion erst nach Ablauf von 14 Krankheitstagen positiv. Bei Komplikationen zeigt sich meist ein früherer und stärkerer positiver Ausfall. Es gibt einfache gonorrhöische Schleimhautkatarrhe und selbst mit Komplikationen einhergehende Fälle, die dauernd negativ bleiben. Die klinische Beobachtung zeigt, daß die Schwere der Erkrankung keineswegs immer mit der Stärke der Reaktion übereinstimmt, allerdings zeigt sich bei Anwendung der Fiebertherapie (Pyriker, Malaria) häufig eine Verstärkung der K.B.R. Es finden sich nicht wenige Fälle, in denen selbst Jahre nach der klinischen und bakteriologischen Heilung die K.B.R. positiv bleibt. Daraus ergibt sich eine nur bedingte Verwendbarkeit der K.B.R. zur Beurteilung der Heilung und der Heiratserlaubnis. Da unspezifische Ausschläge nur in einem geringen Prozentsatz (2–3%) festgestellt wurden, legt ein positiver, wenn auch schwacher Ausfall den Verdacht einer überstandenen oder noch bestehenden Gonorrhoe nahe. Der positive Ausfall der Reaktion hat demnach eine größere Bedeutung als der negative, da ein negativer Ausfall nicht gegen eine überstandene oder noch vorhandene Infektion spricht. Die hier gemachten Feststellungen decken sich mit denen der meisten Autoren. Kristjansen, der als erster an einem großen Material, allerdings unter Benutzung eines anderen, selbst hergestellten Antigens, den Verlauf der K.B.R. darlegte, bezeichnete ihre klinische Brauchbarkeit als bewiesen. Er stellte fest, daß ein negatives Ergebnis nie von entscheidender Bedeutung sein könne. Allerdings spreche z. B. ein dauerndes Negativbleiben der Reaktion bei einer Arthritis gegen eine fragliche gonorrhöische Natur des Leidens. Ein negativer Ausfall spreche in der Frage der Heilung keineswegs gegen ein Weiterbestehen der Infektion. Ein positiver Ausfall der K.B.R. hingegen bilde eine sehr wesentliche Stütze für

die Diagnose und Beurteilung eines Falles, er sei ein sicherer Hinweis, daß der Organismus mit Gonokokken infiziert sei oder infiziert war und verpflichte daher zu eingehender und längere Zeit dauernder Kontrolle. Kloeppel stellte die K.B.R. in diagnostischer Beziehung mit der Wa.R. auf eine Stufe, was die Prozentzahl der positiven Resultate anbelangte, in Bezug auf Spezifität hielt er sie der Wa.R. überlegen. In vergleichenden Reihenuntersuchungen hat Schlesmann die K.B.R. mit der Immuno-Flockungsreaktion verglichen und hat dazu gleichzeitig nebeneinander verschiedene Antigene benutzt (ein eigenes Antigen, das nach Kahn hergestellte Antigen der Labopharma und Compligon). Er bezeichnete beide Reaktionen nach seinen Ergebnissen für brauchbar und genügend spezifisch. Bei gleichem Extrakt zeichnete sich die Immuno-Flockungsreaktion durch größere Empfindlichkeit gegenüber der K.B.R. aus, zeigte aber gleichzeitig eine erhöhte Neigung zur Unspezifität. Das selbst hergestellte Antigen und das Compligon hatten sich gleichwertig gezeigt. Da er bei beiden Verfahren gleichzeitig starke positive Reaktionen beobachtete, ohne daß eine gonorrhoeische Infektion stattgefunden hatte, stellte er als Grundsatz auf, einen serologischen Gonorrhoeenachweis nur dann als beweisend zu betrachten, wenn gleichzeitig klinische oder anamnestiche Beweise vorhanden seien. Da bei der akuten Urethritis der Wert der K.B.R. ein geringer ist, einmal infolge der vielen Verfälscher, dann auch wegen der viel bequemerem klinischen und bakteriologischen Diagnose, bleibt ihr Hauptwert bestehen für die Erkennung der gonorrhoeischen Natur von Komplikationen, besonders der Arthritis, bei fraglichen Iritiden und bei der Frage der Spezifität von Entzündungen der männlichen und weiblichen Adnexe. Der negative Ausfall bei der Urethritis und der positive bei Komplikationen sind wohl einerseits anzusehen als die Folgen der Oberflächlichkeit des Prozesses, auf der anderen Seite als Zeichen des tieferen Eindringens der Gonokokken in die mesenchymalen Gewebe des Organismus und der damit in Gang gebrachten Abwehrmaßnahmen des Körpers. Daraus ergibt sich die prognostische Bedeutung für den Ausfall der Reaktion. Allerdings hinsichtlich dessen, was man gerade brauchte, nämlich der Diagnose der eingetretenen Heilung, ist keine der gebräuchlichen serologischen Reaktionen, auch die K.B.R. nicht, bei ihrem häufigen positiven Ausfall beim abgeheilten und dem negativen bei noch blühendem Tripper zuverlässig verwertbar (Chiale). Dadurch, daß also die Reaktion sowohl vorhandene Erkrankung wie auch früher

vorhanden gewesene Erkrankung anzeigen kann, tritt sie erheblich an praktischer Bedeutung zurück. Auf Grund von Reihenuntersuchungen hält John und in einer neuen Veröffentlichung auch Bering die K.B.R. hauptsächlich für wertvoll zum Nachweis der gonorrhöischen Infektion bei Frauen, da hier die bakteriologischen Untersuchungen in Verbindung mit den verschiedenen Provokationen häufig nicht ausreichen. In positiven Fällen gebe die K.B.R. Veranlassung, mit besonderer Gründlichkeit nach Gonokokken zu fahnden. Dadurch werde die K.B.R., besonders bei der Untersuchung von Puellen immer mehr an Bedeutung gewinnen und zur Sicherung der Diagnose beitragen.

Zusammenfassung.

Aus der Zusammenstellung des Materials der hiesigen Hygienischen Abteilung an Komplementbindungsreaktionen für Gonorrhoe werden folgende Schlüsse gezogen:

1. Die K.B.R. hat bei einfachem Tripper während der ersten 14 Krankheitsstage nur geringen Wert, da sie meist erst nach dieser Zeit positiv wird.

2. Die einfachen Schleimhautkatarrhe hatten positive Ausfälle in 59,2 %, bei Komplikationen war die K.B.R. in 84,1 % positiv von im ganzen 594 Reaktionen bei Go-Kranken.

3. Unspezifische Ausfälle fanden sich 1933 bei den sonstigen 3602 Reaktionen 74mal = 2 %, 1934 (1. Hälfte) bei 1494 restlichen Reaktionen 45mal = 3 %.

4. Der Grad der Reaktion entspricht nicht der Schwere des Falles, unter der Wirkung einer Fiebertherapie tritt oft Verstärkung der K.B.R. auf.

5. Während manche Fälle während des ganzen Krankheitsverlaufes seronegativ bleiben, zeigt sich öfter ein Positivbleiben der K.B.R. bis auf Jahre über die klinische Heilung hinaus.

5. Bei seropositiver und -negativer Lues ist die K.B.R. nur unter Vorzicht zu verwerten. Unter den hier gefundenen Seren mit unspezifischem Ausfall fanden sich 1933 29 Fälle = 39,2 %, 1934 (2. Hälfte) 14 Fälle = 20,3 %.

1934 12 Fälle = 26,7 % mit unspezifischem, durch Lues bedingten Ausfall.

7. Zur Beurteilung der Heilung und der Heiratserlaubnis ist der K.B.R. vorläufig nur ein bedingter Wert zuzusprechen.

8. Injektionen von spezifischen Go.-Vakzinen beeinflussen den Ausfall der K.B.R. im positiven Sinne.

9. Negativer Ausfall der K.B.R. ist nie beweisend, ein positiver weist mit großer Wahrscheinlichkeit auf das Vorhandensein oder Überstehen einer gonorrhöischen Infektion hin und soll stets zu genauester und längere Zeit dauernder Kontrolle veranlassen.

10. Die Hauptbedeutung kommt der K.B.R. (allerdings nur bei positivem Ausfall!) zur Deutung der spezifischen gonorrhöischen Natur in Fällen von Arthritis, Iritis und Adnexerkrankungen fraglicher Genese zu.

Ich freue mich, Herrn Marineoberstabsarzt Priv.-Dozent Dr. Ruge für die Überlassung der Arbeit meinen gehorsamsten Dank aussprechen zu können, und danke ebenfalls der Schering-Kahlbaum A.-G. für ihre freundliche Unterstützung in der Aufindung der Literatur.

Literaturangaben.

1. Barbelliou und Lebert: Journal d'urologie 1933, 35, S. 97.
 2. Bering: D.m.Wo. 1934, 2, S. 56.
 3. Bruck, Behrmann, Rosenbergs: Serodiagnose mit aktiven Seren.
Klin.Wo. 1926, 26, S. 1176.
 4. Brunauer, Müller, Oppenheim: Arch.Derm. 1926, 151, S. 463.
 5. Budlowski und Sagher: Med.Klin. 1933, 51, S. 1716.
 6. Chiaie: Giornale italiano di dermatol. e sifilografia 1933, 74, H.3.
 7. Chwalla: Wien.klin.Wo. 1933, 6, S. 169, 7, S. 206.
 8. Cohn: Derm.Z. 1929, 55, S. 115.
 9. Engel, C.: M.M.Wo. 1932, 42, S. 1697.
 10. John: Derm.Z. 1933, 67, H. 3.
 11. Kloeppel: Arch.Derm. 1924, 147, S. 477.
 12. Kriftjanfen: Arch. f. Derm. u. Syph. 1931, 164, S. 239 u. S. 472.
 13. Marquardt: Derm.Wo. 1932, 50, S. 1797.
 14. Pieper u. Wolffenstein: Med.Welt 1932, 33, S. 1140.
 15. Pieper u. Wolffenstein: Klin.Wo. 1931, 8, S. 354.
 16. Retzlaff: Klin.Wo. 1932, 50, S. 1679.
 17. Schlesmann: Derm.Wo. 1933, 23, S. 791.
 18. Schlirf: M.M.Wo. 1934, 8—9, S. 332/33.
 19. Sommer: Ztschr. f. Geb.hilfe u. Gynäkol. 1934, 106, H. 2
-

Gebenslauf.

Ich, Alfred Alexander Ru e m p l e r (evangel. Bekenntnisses) wurde als Sohn des Zahnarztes Dr. Wilhelm Ru e m p l e r und seiner Ehefrau Elfe, geb. S t r o m e y e r, am 23. Mai 1908 zu Lindau (Bödenfee) geboren. Im Jahre 1910 verlegten meine Eltern ihren Wohnsitz nach Köln. Hier besuchte ich die Vor-schule und Sexta bis Oberprima des Gymnasiums in der Kreuz-gasse, wo ich im März 1926 die Reifeprüfung bestand. Ich stu-dierte Medizin von 1926—28 an der Universität Köln, wo ich April 1928 das Physikum ablegte. Dann erfolgte Weiterstudium in München bis zum W.-S. 1928/29, danach wieder in Köln. Dort beendigte ich am 31. Juli 1931 das Staatsexamen. Darauf begann ich das praktische Jahr vom 1. 9. bis 10. 10. 1931 im Marinelazarett Kiel-Wik. Von Oktober 1931 bis März 1932 fand meine militärische Ausbildung in Stralfund statt. Hierauf setzte ich das praktische Jahr im Marinelazarett Wilhelmshaven fort und wurde am 2. März 1933 approbiert. Zum April 1933 erfolgte meine Kommandierung als Hilfsarzt auf das Linienschiff „Schles-wig-Holstein“. Seit Oktober 1933 bin ich als Halbflottillenarzt bei der 1. Räumbootshalbflottille.
